

Impfungen auf einem Blick

Angelehnt an die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission am RKI¹

Säuglinge und Kleinkinder

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

- | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---|---|--|
| Grundimmunisierung | ■ Tetanus | Grundimmunisierung | ■ Hepatitis B | ■ Rotaviren Schluckimpfung ab einem Alter von 6 Wochen. Von der Ständigen Impfkommission am RKI ² als Standard-Impfung noch nicht empfohlen. | ■ 2x Masern, Mumps, Röteln ■ 2x Varizellen ■ 1x Meningokokken C | |
| | ■ Diphtherie | | ■ Haemophilus influenzae Typ b | | | |
| | ■ Poliomyelitis | | ■ Pneumokokken | | | ■ Influenza ab vollendetem 6. Lm. Jährlich bei Risikopatienten |
| | ■ Pertussis | | | | | |

Vorschulalter (5 bis 6 Jahre)

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

Empfohlene Auffrischimpfung:

- | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|------------|-----------|
| Grundimmunisierung | ■ Tetanus | ■ 2x Masern, Mumps, Röteln ■ 2x Varizellen ■ 1x Meningokokken C ■ Influenza Jährlich bei Risikopatienten | Tetanus | Pertussis |
| | ■ Diphtherie | | Diphtherie | |
| | ■ Poliomyelitis | | | |
| | ■ Pertussis | | | |
| | ■ Hepatitis B | | | |

Jugendliche im Alter von 9–17 Jahren

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

Empfohlene Impfungen:

- | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|---|-----------|---|
| Grundimmunisierung | ■ Tetanus | ■ 2x Masern, Mumps, Röteln ■ 1x Meningokokken C ■ Influenza Jährlich bei Risikopatienten | Auffrischimpfung: | | ■ 2x Varizellen Bei Ungeimpften ohne Varizellen-Anamnese |
| | ■ Diphtherie | | Tetanus | Pertussis | |
| | ■ Poliomyelitis | | Diphtherie | Polio | |
| | ■ Pertussis | | ■ Humane Papillomviren Für Mädchen 12–17 Jahre | | |
| | ■ Hepatitis B | | | | |

Frauen im gebärfähigen Alter

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

Vor der Schwangerschaft:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ■ Tetanus/Diphtherie Grundimmunisierung; Auffrischimpfung alle 10 Jahre | ■ Pertussis Auffrischimpfung alle 10 Jahre | ■ Röteln Bei negativer Röteln-Serologie MMR-Impfung | ■ Influenza Jährlich bei Risikopatientinnen |
| ■ Poliomyelitis Grundimmunisierung und eine Auffrischimpfung; alle 10 Jahre auffrischen (wenn indiziert) | | ■ Varizellen Bei negativer Varizellen-Serologie | |

Erwachsene

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

Zusätzlich für Erwachsene ab 60 Jahre sowie Risikogruppen:

- | | | |
|---|--|---|
| ■ Tetanus/Diphtherie Grundimmunisierung; Auffrischimpfung alle 10 Jahre | ■ Pertussis Einmalig mit der nächsten Td-Impfung, bei entsprechender Indikation auch als Tdap-IPV oder alle 10 Jahre (wenn indiziert) | ■ Pneumokokken-Erkrankungen Einmalig, Wiederimpfung frühestens alle 5 Jahre bei bestimmten Risikopatienten |
| ■ Poliomyelitis Grundimmunisierung und eine Auffrischimpfung; alle 10 Jahre auffrischen (wenn indiziert) | | ■ Influenza Jedes Jahr aktualisieren |